

Těhotenská pacientská karta

Název léčivého přípravku:

(fingolimod)



PROSÍME, NOSTE TUTO KARTU VŽDY U SEBE!

Pokud navštívíte další lékaře, nezapomeňte je informovat, že užíváte přípravek obsahující fingolimod.

**POKUD BUDETE PŘÍPRAVEK OBSAHUJÍCÍ
FINGOLIMOD UŽÍVAT BĚHEM TĚHOTENSTVÍ,
MŮŽE POŠKODIT VAŠE NENAROZENÉ DÍTĚ.**

Přípravek obsahující fingolimod nesmějí užívat těhotné ženy a ženy které by mohly otěhotnět (včetně dospívajících dívek), které neužívají účinnou antikoncepci.

Ženy během léčby NESMÍ otěhotnět.

Účinná antikoncepce se musí používat po celou dobu léčby a ještě po dobu 2 měsíců po jejím skončení, aby se zabránilo otěhotnění.

- Obratťe se na svého lékaře ohledně nejúčinnější antikoncepční metody vhodné pro Vás.
- Před zahájením léčby musí být proveden těhotenský test a jeho negativní výsledek ověřen lékařem.
- Testy se musí během léčby ve vhodných intervalech opakovat.
- Na začátku léčby a poté v pravidelných intervalech během léčby Vás bude Váš lékař informovat ohledně teratogenního rizika (poškození plodu) a nezbytných opatřeních ke snížení rizika.

Přečtěte si, prosím, příbalovou informaci pro pacienty, kterou naleznete v balení léčivého přípravku.

Pokud máte dotazy ohledně informací v této kartě, kontaktujete, prosím, svého lékaře.

Ženy během léčby NESMÍ otěhotnět. Pokud otěhotníte nebo plánujete otěhotnět, musí být léčba přípravkem obsahujícím fingolimod ukončena.

- **Okamžitě informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná** (během léčby přípravkem obsahujícím fingolimod nebo během 2 měsíců po jejím ukončení).
- **V případě těhotenství Vám lékař poskytne poradenství a vyhodnocení možného vlivu na Vaše těhotenství.**



PO UKONČENÍ LÉČBY PŘÍPRAVKEM OBSAHUJÍCÍM FINGOLIMOD

Informujte svého lékaře ihned, pokud budete mít pocit, že se Vaše onemocnění RS zhoršuje (např. slabost či zrakové změny) nebo zaznamenáte nějaké nové příznaky po ukončení léčby.